

Données et méthodes - Projet MoCoRiBA-GC

2024-04-12

Table of contents

La suite d'outils MoCoRiBA	2
Principe de fonctionnement	3
L'interface MoCoRiBA-Viz générale	4
Spécificités des interfaces “partenaires”	8
Le réseau DEPHY	9
Les bases de données	9
Description des bases de données	9
Pratiques et résultats agricoles : Agrosyst	9
Pressions de maladies et de ravageurs : données EPIPHYT et Vigicultures®	10
Météorologie : SAFRAN	10
Réserve utile : GIS sol	10
Traitement et préparation des base de données	10
Préparation de la base Agrosyst	11
Préparation des bases Epiphyt et Vigicultures®	11
Modélisation de la pression ambiante des bioagresseurs	12
Groupe d'exploitations comparables	12
Les grandes régions agroclimatique	13
La distance environnementale	13
Les échelles de comparaison (système, culture, pluri-annuelle, ...)	15
Dimension spatiale	15
Dimension temporelle	15
Les indicateurs	17
Représentations agrégées des indicateurs	17
L'IFT	17

La productivité économique brute	17
Gestion des données utilisateurs	18
Lexique	21
Annexes	21
Détails des métriques et protocoles de suivie des bioagresseurs	21
Détails des métriques de référence en nombre de données des bioagresseurs	31



Réalisé par :  et financé par : 

Le projet MoCoRiBA-GC, Modélisation et Communication du Risque de BioAgresseurs en Grandes Cultures, porté par l'INRAE et en partenariat avec WIUZ, Terres Inovia et l'ITB a débuté en 2019, financé par le plan Ecophyto via l'appel à projet ANR maturation. L'objectif de cet outil est de donner aux agriculteurs et conseillers les éléments nécessaires pour les aider à réduire l'usage de produits phytosanitaires sans impacter leur marge. Pour atteindre son objectif le projet fait appel à différents jeux de données et met en place une méthodologie décrite ci-dessous.

Lien ANR : <https://anr.fr/Projet-ANR-19-ECOM-0009>

La suite d'outils MoCoRiBA


Nos outils permettent, suivant des critères définis par l'utilisateur, de comparer les performances de son exploitation avec d'autres, notamment issues du [réseau DEPHY](#). Ce service vise à alimenter la réflexion stratégique des agriculteurs sur leurs pratiques.

Principe de fonctionnement

Nous connectons des données d'origine diverses (réseau DEPHY, Vigicultures®, données ouvertes, ...) et nous sommes interopérable avec des données utilisateurs DEPHY, WIUZ et SYSTERRE®. L'ensemble des services est fourni de trois manières différentes : le **démonstrateur générique**, des **outils de visualisation spécifiques** à chaque partenaire (WIUZ,...) et une API (*application programming interface*) permettant à des partenaires d'inclure nos résultats et visualisations dans leurs propres plateformes informatiques.

Le traitement se fait à 2 niveaux : - Les bases de données sont au préalable analysées et la donnée est vérifiée. Des filtres peuvent être appliqués afin de retirer les données aberrantes (détail dans la partie *Traitement et préparation des bases de données*). - En temps réel et d'après les critères définis par l'utilisateur, des exploitations comparables sont identifiées pour servir de **base de comparaison**. Les résultats pour différents **indicateurs de performances** sont calculés et présentés, toujours agrégés afin de garantir l'anonymat des exploitations.

Schéma des flux de données



L'interface MoCoRiBA-Viz générale

MoCoRiBA-Viz permet de visualiser des indicateurs agronomiques, économiques et environnementaux caractérisant les systèmes de production des exploitations. La version librement accessible permet d'étudier des exploitations comparables en renseignant son code Insee.

Panneau des paramètres

Le panneau de gauche permet de choisir plusieurs paramètres pour définir l'échelle de travail (le système de culture ou une culture spécifique, une campagne ou plusieurs, etc.) et la base de comparaison. Des filtres additionnels sont également disponibles pour affiner la recherche.

Type de localisation

Code INSEE de la commune

Exploitation

Code INSEE

78615

Grande Culture

Blé tendre d'hiver

Base de Comparaison ?

National

Région agroclimatique

Distance environnemental

Similarité sur :

Une campagne

Multi-campagnes

Climat moyen

Campagne

2022

Force même campagne

% des plus comparables

0 5 30

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

364 comp. (culture x campagne)
Dist. envir.: 10.3/10.3

Filtres additionels

Mode de production

CONVENTIONNEL

Type d'exploitation


GRANDES_CULTURES

Représentations graphiques de l'information

Plusieurs représentations graphiques sont utilisées pour présenter les résultats (box-plot, histogramme, carte,...). Elles suivent une logique de code couleur pour chaque type


d'information : - L'exploitation utilisateur en *bleu* - La base de comparaison en *noir* - Les améliorables en *rouge* - Les performants en *vert*

Lecture d'une représentation graphique de type boxplot



Les graphiques liés aux bioagresseurs des cultures sont issus de résultats de modèles. Ils sont présentés avec des barres illustrant l'incertitude de la prédiction (cf. partie *Modélisation des pressions ambiantes des bioagresseurs*).


Graphique des pressions des bioagresseurs avec barres d'incertitude



Intéreactivité de l'interface


Dans l'onglet 'Exploration' il est possible de faire de la sélection à la voilet. C'est à dire que l'utilisateur est libre de rajouter lui même des filtres additionnels sur la base comparaison. Sur les indicateurs quantitatifs (représentation en boxplot) il est possible de sélectionner une plage graphique pour définir un interval avec une valeur min et une valeur max dans laquelle devront se situer les exploitations comparables. Pour les indicateurs qualitatifs, il est possible de cliquer sur les différents choix possible. Lorsque un sélection à la voilet est faite, la nouvelle base de comparaison filtrée s'affiche en *violet*

Lecture d'un boxplot avec la sélection à la voilet



Aides infobulles

Des aides infobulles sont disponibles en plusieurs endroits. En survolant certains titres ou zones graphiques avec la souris, ou en cliquant sur les « ? », elles fournissent des éléments de compréhension simplifiés sur la fonction ou la construction de l'élément.



Spécificités des interfaces "partenaires"

Nos partenariats avec des gestionnaires les bases de données (WIUZ, Agrosyst et Systerre) permettent aux utilisateurs de ces plateformes de comparer directement les pratiques et résultats de leurs exploitations dans notre interface. Les données des utilisateurs ne sont jamais stockées sur nos serveurs pour éviter tout problème de confidentialité.

Au delà de la visualisation conjointe des résultats de l'exploitation et des résultats des exploitations comparables, ces versions permettent de répondre à des demandes spécifiques de nos partenaires et d'assurer que les modes de calculs des indicateurs sont bien les mêmes pour l'exploitation utilisatrice et pour celle du groupe d'exploitations comparables.

Le réseau DEPHY

Le réseau Dephy est un programme d'action du PLAN ECOPHYTO qui couvre l'ensemble des filières de production et qui associe l'ensemble des acteurs du monde agricole. Le réseau DEPHY vise à valoriser et déployer des techniques et systèmes agricoles qui réduisent l'usage de produits phytosanitaires tout en maintenant la performance économique des systèmes de production. Le réseau DEPHY s'investit auprès de 180 groupes d'agriculteurs (DEPHY FERME) et 200 sites expérimentaux (DEPHY EXPE). Pour capitaliser et mutualiser toutes les références acquises sur les systèmes de cultures économes en produits phytopharmaceutiques au sein du réseau national, le système d'information Agrosyst a été développé avec l'appui de l'INRAE. Ce réseau a globalement des [utilisations de produits phyto-pharmaceutiques nettement inférieures à celles de la "ferme France"](#). Les performances de ce réseau peuvent aussi être explorées via [DephyGraph](#).

Lien : <https://ecophytopic.fr/dephy/quest-ce-que-le-reseau-dephy>

Les bases de données

Description des bases de données

Pratiques et résultats agricoles : Agrosyst

Agrosyst est le support qui capitalise et valorise les données du [réseau DEPHY](#). Il gère l'acquisition et l'hébergement de données de natures différentes (succession des cultures, interventions culturales, règles de décision, mesures, observations, etc.) ainsi que le calcul de variables de synthèse, de bilans, de différents indicateurs, de rapports, etc. C'est un outil clé pour aider les agriculteurs, les chercheurs et les décideurs à gérer les systèmes agricoles de manière plus efficace et durable. Grâce à ses données et ses modèles, elle permet d'améliorer la prise de décision dans les pratiques agricoles et de promouvoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement.

Lien : <https://dephygraph.fr/>

Pressions de maladies et de ravageurs : données EIPHYT et Vigicultures®

Les données EIPHYT rassemblait les observations en matière de santé des végétaux réalisées sur l'ensemble du territoire, dans le cadre du réseau d'épidémiosurveillance porté par le plan ECOPHYTO. Le système d'information Vigicultures® s'est ensuite progressivement imposé comme base de centralisation des données au niveau national. Ces données sont utilisées par le projet MoCoRiBA pour [calculer des indicateurs de pression sur plusieurs bioagresseurs](#).

Lien : <https://agriculture.gouv.fr/le-reseau-depidemiosurveillance-decophyto>

Météorologie : SAFRAN

La base SAFRAN (Système d'Analyse Fournissant des Renseignements Adaptés à la Nivologie) est une base de données météorologiques développée par Météo-France. Elle fournit des analyses fines de diverses variables climatiques (température, précipitations, vent, rayonnement solaire, etc.) à une résolution spatiale d'environ 8 km² et une résolution temporelle horaire ou journalière. SAFRAN couvre la France métropolitaine et est particulièrement utilisée pour des études en climatologie, hydrologie et modélisation environnementale. La base intègre aussi des données historiques et sert à modéliser l'évolution du climat, des ressources en eau et de la neige, notamment en montagne. Elle est couramment utilisée dans les projets de recherche et de gestion des risques naturels.

Réserve utile : GIS sol

Les travaux du GIS Sol sont conduits autour de quatre grands programmes complémentaires : l'Inventaire, Gestion et Conservation des Sols (IGCS), le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS), la Base de Données des Analyses de Terre (BDAT) et la collecte nationale d'analyse des Éléments Traces Métalliques (BDETM). Le projet MoCoRiBA utilise les données sur la réserve utile moyenne des sols de la commune (code INSEE) d'après la carte du GIS sol.

Lien carte GIS Sol : <https://www.gissol.fr/donnees/cartes>

Traitement et préparation des bases de données

Les bases de données sont traitées en amont pour contrôler, valider, corriger et mettre en forme les données, de façon à ce qu'elles soient directement utilisables par l'outil MoCoRiBA. Des filtres spécifiques peuvent être appliqués à chaque jeu de données pour retirer ou corriger les informations qui pourraient être aberrantes. L'ensemble des processus de traitement est décrit ci-dessous pour chacune des bases de données.

Préparation de la base Agrosyst

Quelques filtres sont appliqués sur la base Agrosyst. Lorsque des valeurs aberrantes sont détectées (ex: rendement de blés > 180 qt/ha), ces valeurs sont considérées comme “non acquises” et ne sont pas représentées dans l’application.

Le détail des filtres appliqués est en cours de rédaction.

Préparation des bases Epiphyt et Vigicultures®

Les deux bases de données de bioagresseurs suivent le même processus de traitement avant d’être fusionnées et à nouveau contrôlées pour éviter les doublons (observations présentent dans les 2 bases de données). Processus de traitement :

- Etape 1 - filtre sur les données d’observations On trouve dans la donnée à la fois des données d’observations sur les bioagresseurs, mais également des commentaires et des suivies de stades de cultures. La 1ère étape consiste à conserver uniquement les données d’observation. On retire également les données pour lesquelles la valeur de l’observation est manquante et/ou non numérique.
- Etape 2 - contrôle des informations géographiques des points d’observation On contrôle la cohérence entre les coordonnées GPS du point d’observation, la commune, le département et la région.
- Etape 3 - contrôle des observations dupliquées et/ou très similaires Le trie sur les observations en double se faire en 4 étapes avec des critères de plus en plus souple à chaque fois pour les retirer. Pour les étapes (c) et (d), on vérifi que la proportion de dupliqué est extrêmement faible.
 - a) L’ensemble des données pour 1 observation sont identique (Ligne dupliqué)
 - b) Même ID_plot, date observation, valeur de l’observation et coordonnées GPS (Une autres infomations dans la base est différentes)
 - c) Même ID_plot, date observation et valeur de l’observation (Coordonnées GPS différentes ou avec une précision différentes)
 - d) Même ID_plot et date observation (La valeur observée est différente)
- Etape 4 - sélection manuelle des métriques (protocoles d’observations) On conserve uniquement les métriques de suivie des maladies et ravageurs pour les cultures qui nous intéresses. Pour la base Epiphyt, on cherche la correspondance avec le protocole Vigicultures manuellement. Cependant, certaines métriques n’on pas de correspondance identifiée. La liste des métriques est disponible en [annexe](#).
- Etape 5 - fusion des 2 bases de données et filtre sur les observations dupliquées Les sous-étapes de l’étape 3) sont répétée à nouveau. Dans ce cas là on conserve toujours le dupliqué qui se trouve dans la base Vigicultures.

- Etape 6 - création de la liste des métriques de référence Pour chaque organisme, on sélectionne comme métrique de référence, celle qui possède le plus d'observations dans la base de données. Ce sont ces métriques qui sont utilisées dans les modèles de bioagresseurs et disponibles sur l'interface MoCoRiBA-Viz. Cette liste est disponible en [annexe](#).

Modélisation de la pression ambiante des bioagresseurs

Le modèle de bioagresseur est construit à partir des données d'observation des réseaux d'épidémiosurveillance. La donnée étant issue de plusieurs observateurs, elle présente une certaine hétérogénéité. Pour réaliser une analyse statistique correcte, il est nécessaire de fiabiliser la donnée. Pour cela, on définit, par bioagresseur, un seuil correspondant à la médiane des observations présentes dans la base. Les valeurs dépassant ce seuil sont comptabilisées comme positives. Le ratio du nombre d'observations positives sur le nombre d'observations total définit la probabilité de dépassement du seuil une année ou un mois donné dans une parcelle observée (entre 0 et 1).

Pour déterminer la pression d'un bioagresseur en tout point du territoire, nous faisons une interpolation. C'est une moyenne des pressions observées sur les parcelles aux alentours, pondérées par une exponentielle décroissant avec la distance. En d'autres termes, plus une parcelle connue sera proche, plus elle aura un poids important dans la prédiction. Le paramètre indiquant la vitesse de décroissance du poids avec la distance est estimée par Jack-knife. La moyenne pondérée obtenue (pression ambiante) correspond toujours à une probabilité de dépassement de la médiane de toutes les observations et est donc comprise entre 0 et 1.

Le modèle prend également la pression moyenne des années précédentes (*a priori* bayésien). Le modèle statistique que nous utilisons permet d'estimer l'incertitude de la prédiction. Nous indiquons sur les figures l'intervalle de confiance à 95% de la pression estimée. Celle-ci évolue fortement en fonction du volume d'informations disponibles aux environs.

Le modèle ne prend pas en compte les pratiques agronomiques intrinsèques aux exploitations. C'est donc une pression moyenne ambiante qui est estimée. Elle correspond à un contexte ambiant dans lequel s'intègre une parcelle, mais qui peut être modulé par les pratiques de l'agriculteur.


Le modèle de bioagresseurs est l'aboutissement du travail réalisé à la suite de plusieurs stages dont [celui de Clément CHEVALEYRE en 2023](#).

Groupe d'exploitations comparables

Les exploitations comparables sont identifiées en fonction de plusieurs paramètres choisis par l'utilisateur. Il sélectionne les campagnes et cultures d'intérêt, restreint éventuellement la sélection

tion à une aire géographique ou utilise notre critère de similarité sur la base de la distance environnementale (détaillée ci-dessous).

Les grandes régions agroclimatique



La distance environnementale


La distance environnementale quantifie les différences de météo et de sols entre les exploitations. La pondération de ces différentes variables dépend de leur importance pour la prédiction du rendement.

Différentes variables climatiques ont été intégrées dans un modèle de prédiction du rendement par culture (modèle linéaire de type LASSO). Les coefficients estimés des différentes variables servent de pondération dans le calcul de la distance euclidienne entre les exploitations. C'est cette valeur que nous qualifions de distance environnementale.

La distance environnementale de référence est définie par la moyenne des écarts maximums que l'on peut trouver entre les exploitations DEPHY au sein d'une grande région agroclimatique une année donnée. Cette référence est spécifique à chaque culture.

La distance environnementale au niveau du système de culture est calculé sur le même principe à l'exception que l'on ne peut pas faire de modèle de rendement. On prend les variables explicatives de l'ensemble des modèles réalisés pour les cultures. Pour chaque variable, on fait la moyenne des coefficients de pondération, eux-mêmes pondérés par la proportion moyenne de la surface de la culture dans les exploitations DEPHY. Puis, de la même manière que précédemment, on calcule la distance environnementale sur ce groupe de variable.

Schéma de la création du groupe d'exploitations comparables sur la base du calcul de la distance environnementale



Les échelles de comparaison (système, culture, pluri-annuelle, ...)

Dimension spatiale

L'unité de base des calculs est la “grande parcelle”, cependant, cette échelle est le plus souvent trop fine pour être utile lorsque l'on aborde l'efficacité du système de culture. Lorsque des indicateurs sont présentés à l'échelle du système de culture, nous utilisons la moyenne des indicateurs par grande parcelle, pondérée par la surface.

Dimension temporelle

Similarité sur une campagne


Similarité basée sur une aire géographique

Il est possible de se limiter à une campagne en jouant sur les curseurs de campagne. Attention, il n'est pas possible de séparer ensuite les curseurs sauf en changeant la base de comparaison.

Similarité basée sur la distance environnementale

Pour la campagne choisie, on cherche les exploitations et campagnes les plus similaires dans la base Agrosyst sur la base du calcul de la distance environnementale.

Schéma de la recherche des comparables pour une campagne



Similarité sur plusieurs campagnes

Similarité basée sur une aire géographique

Par défaut, plusieurs années sont sélectionnées. Pour chaque exploitation dans l'aire géographique, on fait la moyenne de l'indicateur pondérée par la surface chaque année. Par exemple, le rendement moyen du blé sur deux ans sera la moyenne pondérée par la surface de blé la première et la deuxième année.

$$Rdt = \frac{\sum_{annee} Rdt_{annee} \times Surface_{annee}}{\sum_{annee} Surface_{annee}}$$


Similarité basée sur la distance environnementale

Deux modalités sont proposées : climat moyen et multi-campagne.


L'approche *climat moyen* cherche les exploitations les plus comparables en termes de moyennes des variables climatiques. Nous commençons par faire la moyenne inter-annuelle par variable (ex: T° moyenne du mois de juin) sur les années sélectionnées, puis nous appliquons la distance environnementale sur ces moyennes pour sélectionner les x% les plus comparables à l'exploitation de l'utilisateur. L'inconvénient de cette approche, c'est qu'elle ne rend pas compte de la variabilité des climats d'une année sur l'autre.

Nous avons par conséquent développé, l'approche *multi-campagne* qui commence par identifier les x% les plus comparables campagne par campagne. Nous calculons ensuite les quantiles des indicateurs par campagne. Enfin, la valeur multi-campagne des quantiles correspond à la moyenne de chaque quantile pondérée par la surface par campagne dans l'exploitation de référence (ou a part égale lorsque ces surfaces ne sont pas connues). Nous maintenons ainsi une comparaison campagne par campagne tout en donnant plus de poids aux campagnes pour lesquelles l'utilisateur a une surface cultivée plus importante.

Calcul de la distance environnementale campagne par campagne



Moyenne des campagnes puis la distance environnementale



Les indicateurs

Représentations agrégées des indicateurs

Les indicateurs sont présentés généralement sous la forme de boxplot ou boîte à moustaches. Les limites du boxplot correspondent aux quantiles 5, 25, 50, 75 et 95% des observations pour cet indicateur.

L'IFT

Les IFT indiqués actuellement sont les IFTs calculés séparément par chaque fournisseur de données, chacun appliquant les méthodes de l'[atelier de calcul du ministère de l'agriculture](#).

La productivité économique brute

La productivité économique correspond simplement à la multiplication des rendements par la moyenne des prix de vente au cours des dernières années.

	Cultures	Destinations	€/T conventionnel	€/T bio
2	Blé tendre	Grain	160	395
3	Blé dur	Grain	215	500
4	Orge d'hiver	Grain	155	270
5	Orge de printemps	Grain	185	340
6	Maïs	Grain	145	295
7	Maïs	Fourrage	100	130
8	Maïs	Ensilage	100	130
9	Triticale	Grain	140	270
10	Colza	Grain	355	800
11	Pois	Grain	200	400
12	Tournesol	Grain	345	580
13	Féverole	Grain	210	380
14	Soja	Grain	350	690
15	Betterave	Sucre	27	80
16	Pomme de terre	Tubercule	175	330
17	Lin	Paille	2900	3500
18	Lin	Grain	450	580
19	Méteil	Grain	140	320
20	Luzerne	Paturage	70	80
21	Luzerne	Fourrage	135	155
22	Luzerne	Ensilage	135	155

	Cultures	Destinations	€/T conventionnel	€/T bio
23	Pois chiche	Grain	550	1010
24	Sorgho	Grain	135	250
25	Chanvre	NA	180	305
26	Chanvre	Paille	110	150
27	Chanvre	Grain	650	1300
28	Lentille	Grain	600	1340
29	Sarrasin	Grain	NA	805
30	Avoine	Grain	135	250
31	Seigle	Grain	140	250
32	Prairie temporaire	Paturage	65	75
33	Prairie temporaire	Fourrage	120	140
34	RGI	Fourrage	145	NA
35	Méteil	Fourrage	100	125

Pour les autres cultures, en l'absence de référence, la productivité à l'hectare est considérée comme égale à la productivité moyenne de la culture la moins rentable à l'hectare :

$$Prix = \frac{\min_{culture} (Rdt_{culture} \cdot Prix_{culture})}{Rdt}$$

où $Prix$ est le prix de vente de la culture et Rdt est le rendement moyen de la culture tel qu'observé dans le jeu de données. Pour chaque culture dont le prix de vente est connu, $Rdt_{culture}$ est le rendement moyen dans le jeu de données et $Prix_{culture}$ est le prix dans le tableau ci-dessus.

Gestion des données utilisateurs

Aucune donnée utilisateur n'est conservée de manière permanente sur nos serveurs sans le consentement de l'utilisateur. Les seules bases de données stockées sur le serveur sont celles nécessaires au fonctionnement de l'outil, et elles sont 100 % anonymisées.

Fonctionnement du système de session utilisateur

Lors de l'ouverture de l'outil web MoCoRiBA-Viz, une session utilisateur est ouverte sur l'API MoCoRiBA avec un identifiant et une clé d'accès. L'identifiant est automatiquement ajouté à l'url de navigation dans la barre d'adresse et la clé d'accès correspondante est déposée sous forme d'un cookie sur le navigateur. Ce système stocke les informations relatives à l'utilisateur (données d'exploitation) ainsi que les paramètres d'état de la session (valeurs saisies ou sélectionnées dans le panneau latéral de l'interface web).

Grâce à son architecture, ce système permet de : - gagner en efficacité de réponse. Limite la taille des requêtes à l'API et les opérations de calcul redondantes. - monter en charge. Assure la possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs simultanés sans dégrader les temps de réponse et l'expérience utilisateur. - conserver des informations de session pour recharger la page avec l'URL. - partager l'URL de la session à une autre personne.


Durée de vie d'une session et de conservation de la donnée

Les informations de session sont conservées en cache pendant toute la durée d'utilisation de l'outil, ainsi qu'une heure après la déconnexion de l'outil (fermeture de la page, déconnexion automatique du serveur si plus d'échanges, etc.). Il est possible de rendre la session persistante (dans la limite de 7 jours) notamment dans le cas d'une utilisation régulière de l'outil et d'une reprise de la session dans son état antérieur à chaque reconnexion (voir ci-dessous). Cette fonctionnalité est disponible dans le menu des sessions.

Rechargement d'une session

S'il le souhaite, un utilisateur peut recharger l'état de ses paramètres de session s'il se reconnecte dans un délai inférieur à la durée de conservation de ses données (voir au-dessus). La procédure de rechargement de la session repose sur une double identification de l'utilisateur : - via le lien URL avec l'identifiant de sa session (Exemple d'URL : <https://mocariba.fr/general/?id=9UT21Qsj3yyl7up2sqf7>) - via le cookie déposé sur son navigateur contenant la clé d'accès de la session

Le liens permet de recharger directement l'ensemble des paramètres du panneau latérale de l'outil. Le chargement de l'exploitation est réalisé seulement si la clé d'accès associé à l'identifiant utilisateur est présent sur le navigateur. Cette vérification permet de s'assurer qu'une personne ayant récupéré l'identifiant d'un utilisateur ne puisse pas récupérer facilement l'accès aux données de l'exploitations.



Partage d'une session utilisateur à une personne tier

Toute personne disposant du lien URL de la session utilisateur pourra recharger les paramètres du bandeau latéral (dans la limite de durée de vie définie par la personne à l'origine de la session). Cependant, il ne pourra pas recharger directement les données de l'exploitations, sauf s'il dispose des informations nécessaires. La fonctionnalité de partage de session, disponible dans le menu des sessions, génère un lien pour permettre à toute personne qui en dispose de recharger la session dans son intégralité.

Gestion des données exploitations des versions partenaires

Les utilisateurs peuvent visualiser leur exploitation dans l'outil MoCoRiBA-Viz aux travers des différentes interfaces partenaires. Soit ils importer directement leurs données dans l'outil, soit elles sont téléchargées en temps réel sur les serveurs de leur gestionnaire de parcellaire lors de leur authentification. Elles ne sont donc pas directement accessibles sur nos serveurs afin de les rendre peu accessibles à d'éventuels attaquants de nos serveurs.

Lexique

Annexes

Détails des métriques et protocoles de suivie des bioagresseurs

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Betterave	Cercosporiose	CERCO_%F	Cercosporiose - % de feuilles atteintes
Betterave	Cercosporiose	EPIPHYT_CERCO_NT_%F	
Betterave	Cercosporiose	EPIPHYT_CERCO_T1_%F	
Betterave	Pégomyie	EPIPHYT_PEGO_%PLT	
Betterave	Puceron noir	EPIPHYT_PUCNOIR_%	
Betterave	Puceron vert	EPIPHYT_PUCAVERT_%	
Betterave	Rouille	EPIPHYT_ROUILLE_NT_%F	
Betterave	Rouille	EPIPHYT_ROUILLE_T1_%F	
Betterave	Pégomyie	PEGO_%PLT_REAL	Pégomyies - % de plantes avec galeries
Betterave	Pégomyie	PEGO_%PLT_REAL	Pégomyies - % de plantes avec oeufs
Betterave	Puceron noir	PUC_NOIR_%PUCAL	Pucerons ailés - % de plantes avec ailés
Betterave	Puceron noir	PUC_NOIR_%PUCAPTE	Pucerons aptères - % de plantes avec aptères
Betterave	Puceron noir	PUC_NOIR_%PUCCOL	Pucerons colonies - % de plantes avec colonies
Betterave	Puceron vert	PUC_VERT_%PUCAL	Pucerons ailés - % de plantes avec ailés
Betterave	Puceron vert	PUC_VERT_%PUCAPTE	Pucerons aptères - % de plantes avec aptères
Betterave	Rouille	ROUILLE_%F	Rouille - % de feuilles atteintes
Betterave	Teigne de la betterave	TEIGNE_%DEC	Teignes - % de plantes avec dégâts
Betterave	Teigne de la betterave	X_TEIGNE_NT	Teignes - nombre de papillons capturés
Blé dur d'hiver	Fusariose	FUSA_TIG_%	Fusariose base tige_%
Blé dur d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F1	Helminthosporiose F1
Blé dur d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F2	Helminthosporiose F2
Blé dur d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F3	Helminthosporiose F3
Blé dur d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF1	Oïdium F1

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Blé dur d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF2	Oïdium F2
Blé dur d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3
Blé dur d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PIE	Entomologie automne pièges englués
Blé dur d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANT	Entomologie automne (sur plantes)_%
Blé dur d'hiver	Puceron	PUC_EPI_PLANT	Entomologie des épis_%
Blé dur d'hiver	Piétin verse	PV_%	Piétin verse_%
Blé dur d'hiver	Rouille brune du blé	RBF1	Rouille Brune F1
Blé dur d'hiver	Rouille brune du blé	RBF2	Rouille Brune F2
Blé dur d'hiver	Rouille brune du blé	RBF3	Rouille Brune F3
Blé dur d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F1	Rouille Jaune F1
Blé dur d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F2	Rouille Jaune F2
Blé dur d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F3	Rouille Jaune F3
Blé dur d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF1	Septoriose F1
Blé dur d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF2	Septoriose F2
Blé dur d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF3	Septoriose F3
Blé tendre d'hiver	Fusariose	FUSA_TIG_%	Fusariose base tige_%
Blé tendre d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F1	Helminthosporiose F1
Blé tendre d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F2	Helminthosporiose F2

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Blé tendre d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F3	Helminthosporiose F3
Blé tendre d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF1	Oidium F1
Blé tendre d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF2	Oidium F2
Blé tendre d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF3	Oidium F3
Blé tendre d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PIEUENGL	Puceron d automne pièges englués
Blé tendre d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANTON%	Puceron d automne (sur plantes)_%
Blé tendre d'hiver	Puceron	PUC_EPI_PLANTON%	Puceron des épis_%
Blé tendre d'hiver	Piétin verse	PV_%	Piétin verse_%
Blé tendre d'hiver	Rouille brune du blé	RBF1	Rouille Brune F1
Blé tendre d'hiver	Rouille brune du blé	RBF2	Rouille Brune F2
Blé tendre d'hiver	Rouille brune du blé	RBF3	Rouille Brune F3
Blé tendre d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F1	Rouille Jaune F1
Blé tendre d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F2	Rouille Jaune F2

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Blé tendre d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_#	Rouille Jaune F3
Blé tendre d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF1	Septoriose F1
Blé tendre d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF2	Septoriose F2
Blé tendre d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF3	Septoriose F3
Colza d'hiver	Altise	A%M	Altises : % de plantes avec morsures
Colza d'hiver	Altise	A%MB	Altises : % de plantes avec morsures (en bordure)
Colza d'hiver	Altise	A%SF	Altises : % de la surface foliaire détruite
Colza d'hiver	Altise	A%SFB	Altises : % de la surface foliaire détruite (en bordure)
Colza d'hiver	Charançon du bourgeon terminal	CBT%B	Charançon du bourgeon terminal : % de plantes cœur détruit ou port buissonnant
Colza d'hiver	Charançon du bourgeon terminal	CBT%C	Charançon du bourgeon terminal : % de plantes avec larves
Colza d'hiver	Charançon du bourgeon terminal	CBTNbV	Piège : Nb de charançons du bourgeon terminal
Colza d'hiver	Charançon de la tige du chou	ChCNbV	Piège : Nb de charançons tige du chou
Colza d'hiver	Charançon de la tige du colza	ChT%T	Charançon tige du colza : % plantes avec dégâts (déformation, éclatement)
Colza d'hiver	Charançon de la tige du colza	ChTNbP	Charançon tige du colza / Nb de pontes par plante
Colza d'hiver	Charançon de la tige du colza	ChTNbV	Piège : Nb de charançons tige du colza
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	EPIPHYT_MelNA	NA
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	EPIPHYT_MelNA	NA
Colza d'hiver	Sclérotiniose	EPIPHYT_SclNA	NA

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Colza d'hiver	Altise Grosse d'hiver du Colza	GANbPE	Piège enterré : Nb d'altises d'hiver (grosses altises)
Colza d'hiver	Sclérotiniose	K1NbF?	Kit fleur n°1 F1-G1 : Nb fleurs douteuses Sclerotinia
Colza d'hiver	Altise Grosse d'hiver du Colza	LGA%B	Altise d'hiver / Grosse altise : % de plantes avec cœur détruit ou port buissonnant
Colza d'hiver	Altise Grosse d'hiver du Colza	LGA%P	Altise d'hiver / Grosse altise : % de plantes avec au moins une larve
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	Mel%P	Méligèthe : % de plantes (en parcelle) avec présence
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	Mel%PB	Méligèthe : % de plantes (en bordure) avec présence
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	MelCu	Piège : présence de méligèthes
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	MelNbP	Méligèthe : Nb moyen par plante (en parcelle)
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	MelNbPB	Méligèthe : Nb moyen par plante (en bordure)
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	MelNbV	Piège : Nb de méligèthes
Colza d'hiver	Altise petite des crucifères	PANbV	Piège : Nb d'altises des crucifères (Petites altises)
Colza d'hiver	Phoma	Pho%M	Phoma : % de plantes avec macules foliaires
Colza d'hiver	Phoma	Pho%N	Phoma : % de plantes avec nécrose au collet
Colza d'hiver	Puceron vert du pêcher	PV%P	Puceron vert : % de plantes avec présence
Colza d'hiver	Sclérotiniose	Scl%C	Sclerotinia : % de plantes avec symptômes collet
Maïs	Chrysomèle des racines du maïs	CHRYSM_NB_PG_SEXUEL	CHRYSM_NB_PG_SEXUEL piège sexuel par semaine
Maïs	Chrysomèle des racines du maïs	CHRYSM_NB_PLTS_OBS	CHRYSM_NB_PLTS_OBS Nb plantes observées
Maïs	Chrysomèle des racines du maïs	EPIPHYT_CHRYSM_NB_PG_CHROM	EPIPHYT_CHRYSM_NB_PG_CHROM
Maïs	Insectes foreurs de la tige	FOR_%EPI_ATQ_AVZP	FOR_%EPI_ATQ_AVZP Répis attaqués avt récolte

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Maïs	Insectes foreurs de la tige	FOR_%PL_ATTICREASTREFC	Cerises attaqués avt recolte
Maïs	Insectes foreurs de la tige	FOR_NBGAL/PFEursAMTB	Galeries/plte avant recolte
Maïs	Pyrale du maïs	PYR_LUM_NBPyADULTES	Adultes pièges Lumineux
Maïs	Pyrale du maïs	PYR_PHE_NBPyADULTES	Spillons Phéromone
Maïs	Sésamie	SES_LUM_NBSADULTES	Adultes pièges Lumineux
Maïs	Sésamie	SES_PHE_NBSADULTES	Spillons Phéromone
Maïs	Taupin	TAUPINS	Taupins
Orge d'hiver	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F1	Helminthosporiose teres F1
Orge d'hiver	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F2	Helminthosporiose teres F2
Orge d'hiver	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F3	Helminthosporiose teres F3
Orge d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF1	Oïdium F1
Orge d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF2	Oïdium F2
Orge d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3
Orge d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANTON% d automne (sur plantes)_%	
Orge d'hiver	Rhynchosporiose	RHYNCF1	Rhynchosporiose F1
Orge d'hiver	Rhynchosporiose	RHYNCF2	Rhynchosporiose F2
Orge d'hiver	Rhynchosporiose	RHYNCF3	Rhynchosporiose F3
Orge d'hiver	Rouille jaune de l'orge D teres	ROUIL_JAU_F1	Rouille Jaune F1
Orge d'hiver	Rouille jaune de l'orge D teres	ROUIL_JAU_F2	Rouille Jaune F2
Orge d'hiver	Rouille jaune de l'orge D teres	ROUIL_JAU_F3	Rouille Jaune F3
Orge de print-emp	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F1	Helminthosporiose teres F1

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Orge de printemps	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F2	Helminthosporiose teres F2
Orge de printemps	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F3	Helminthosporiose teres F3
Orge de printemps	Oïdium des céréales	OIDF1	Oïdium F1
Orge de printemps	Oïdium des céréales	OIDF2	Oïdium F2
Orge de printemps	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3
Orge de printemps	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANTON%	Autumn d automne (sur plantes)_%
Orge de printemps	Rhynchosporiose	RHYNCF1	Rhynchosporiose F1
Orge de printemps	Rhynchosporiose	RHYNCF2	Rhynchosporiose F2
Orge de printemps	Rhynchosporiose	RHYNCF3	Rhynchosporiose F3
Pois d'hiver	Anthracnose	ANTHRA_INF%	Anthracnose moitié inf. végétation (%)
Pois d'hiver	Anthracnose	ANTHRA_SUP%	Anthracnose moitié sup. végétation (%)
Pois d'hiver	Botrytis du pois	BOTRYT_%	Botrytis (%)
Pois d'hiver	Anthracnose	HAUT_ANTHRA	Anthracnose_haut moyenne nécrose en cm
Pois d'hiver	Mildiou du pois	MILD_INF_%	Mildiou 2nd conta. : moitié inf. végé. (%)
Pois d'hiver	Mildiou du pois	MILD_SUP_%	Mildiou 2nd conta. : moitié sup. végé. (%)

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Pois d'hiver	Mildiou du pois	MILDIOU_COM	Mildiou contamination primaire_%
Pois d'hiver	Oïdium du pois	OID_INF_%	Oïdium : moitié inf. de la végétation (%)
Pois d'hiver	Oïdium du pois	OID_SUP_%	Oïdium : moitié sup. de la végétation (%)
Pois d'hiver	Puceron vert du pois	PUCVERT_NE	Puceron vert du pois
Pois d'hiver	Rouille du pois	ROUIL_INF_%	Rouille : moitié inf. de la végétation (%)
Pois d'hiver	Rouille du pois	ROUIL_SUP_%	Rouille : moitié sup. de la végétation (%)
Pois d'hiver	Sitone du pois	SITONE	Sitone du pois
Pois d'hiver	Tordeuse du pois	TORDPOIS	Tordeuse du pois
Pois de print-emp	Anthracnose	ANTHRA_INF%	Anthracnose moitié inf. végétation (%)
Pois de print-emp	Anthracnose	ANTHRA_SUP%	Anthracnose moitié sup. végétation (%)
Pois de print-emp	Botrytis du pois	BOTRYT_%	Botrytis (%)
Pois de print-emp	Anthracnose	HAUT_ANTHRA	Anthracnose_haut moyenne nécrose en cm
Pois de print-emp	Mildiou du pois	MILD_INF_%	Mildiou 2nd conta. : moitié inf. végé. (%)
Pois de print-emp	Mildiou du pois	MILD_SUP_%	Mildiou 2nd conta. : moitié sup. végé. (%)
Pois de print-emp	Mildiou du pois	MILDIOU_COM	Mildiou contamination primaire_%
Pois de print-emp	Oïdium du pois	OID_INF_%	Oïdium : moitié inf. de la végétation (%)

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Pois de print-emp	Oïdium du pois	OID_SUP_%	Oïdium : moitié sup. de la végétation (%)
Pois de print-emp	Puceron vert du pois	PUCVERT_NB	Puceron vert du pois
Pois de print-emp	Rouille du pois	ROUIL_INF_%	Rouille : moitié inf. de la végétation (%)
Pois de print-emp	Rouille du pois	ROUIL_SUP_%	Rouille : moitié sup. de la végétation (%)
Pois de print-emp	Sitone du pois	SITONE	Sitone du pois
Pois de print-emp	Tordeuse du pois	TORDPOIS	Tordeuse du pois
Pomme de terre	Alternariose de la pomme de terre	ALTERNA	Alternariose
Pomme de terre	Doryphores	DORYPHORES	Doryphores adultes sur 20 stations
Pomme de terre	Puceron	EPIPHYT_PUC	NAFOL_INT
Pomme de terre	Mildiou de la pomme de terre	MILDIOU	Mildiou
Pomme de terre	Puceron	NB_PUCERON_FOL	Puceron nb sur folioles
Pomme de terre	Puceron	PUCERO_BAS	Puceron NB/plantes (s/20pltes) bas
Pomme de terre	Puceron	PUCERO_CENTRE	Puceron NB/plantes (s/20pltes) centre
Pomme de terre	Puceron	PUCERO_HAUT	Puceron NB/plantes (s/20pltes) haut
Pomme de terre	Puceron	PUCERON_FOL_DOR	Puceron % folioles porteuses
Tournesol	Limace	EPIPHYT_ManLim	ManLim
Tournesol	Limace	ManLim	Limaces - dégâts sur plantes (en parcelle)
Tournesol	Limace	ManLimB	Limaces - dégâts sur plantes (en bordure)

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Tournesol	Phoma macdonaldi Maladie des tâches noires	PhaCap	Phoma - % de plantes avec symptômes Boutons Capitules
Tournesol	Phoma macdonaldi Maladie des tâches noires	PhaCol	Phoma au collet - % de plantes avec symptômes
Tournesol	Phoma macdonaldi Maladie des tâches noires	PhaFeu	Phoma - % de plantes avec symptômes Feuilles
Tournesol	Phoma macdonaldi Maladie des tâches noires	PhaTig	Phoma - % de plantes avec symptômes Tiges
Tournesol	Phomopsis du tournesol	PhoCap	Phomopsis - % de plantes avec symptômes Boutons Capitules
Tournesol	Phomopsis du tournesol	PhoCol	Phomopsis - % de plantes avec symptômes Collet
Tournesol	Phomopsis du tournesol	PhoFeu	Phomopsis - % de plantes avec symptômes Feuilles
Tournesol	Phomopsis du tournesol	PhoTig	Phomopsis - % de plantes avec symptômes Tiges
Tournesol	Puceron noir de la fève	PucNoi	Puceron noir de la fève - % de plantes avec présence
Tournesol	Puceron vert du prunier	PucV%PI	Puceron vert du prunier - % de plantes avec pucerons
Tournesol	Puceron vert du prunier	PucVCri	Puceron vert du prunier - % de plantes avec crispations feuilles
Tournesol	Puceron vert du prunier	PuVNB	Puceron vert du prunier - Nombre par plante
Triticale	Fusariose	FUSA_TIG_%	Fusariose base tige_%
Triticale	Oïdium des céréales	OIDF1	Oïdium F1
Triticale	Oïdium des céréales	OIDF2	Oïdium F2
Triticale	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3
Triticale	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PIE%ENGL	Pucerons d automne pièges englués
Triticale	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANT%	Pucerons d automne (sur plantes)%
Triticale	Piétin verse	PV_%	Piétin verse_%
Triticale	Rouille brune du blé	RBF1	Rouille Brune F1
Triticale	Rouille brune du blé	RBF2	Rouille Brune F2
Triticale	Rouille brune du blé	RBF3	Rouille Brune F3

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Triticale	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F1	Rouille Jaune F1
Triticale	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F2	Rouille Jaune F2
Triticale	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_F3	Rouille Jaune F3
Triticale	Septoriose des céréales tritici	SEPF1	Septoriose F1
Triticale	Septoriose des céréales tritici	SEPF2	Septoriose F2
Triticale	Septoriose des céréales tritici	SEPF3	Septoriose F3

Détails des métriques de référence en nombre de données des bioagresseurs

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Betterave	Cercosporiose	CERCO_%F	Cercosporiose - % de feuilles atteintes
Betterave	Pégomyie	PEGO_%PLT	Pégomyies - % de plantes avec galeries
Betterave	Puceron noir	PUC_NOIR_%PLT	Pucerons aptères - % de plantes avec aptères
Betterave	Puceron vert	PUC_VERT_%PLT	Pucerons ailés - % de plantes avec ailés
Betterave	Rouille	ROUILLE_%F	Rouille - % de feuilles atteintes
Betterave	Teigne de la betterave	TEIGNE_%DEG	Teignes - % de plantes avec dégâts
Blé dur d'hiver	Fusariose	FUSA_TIG_%	Fusariose base tige_%
Blé dur d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F3	Helminthosporiose F3
Blé dur d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3
Blé dur d'hiver	Piétin verse	PV_%	Piétin verse_%
Blé dur d'hiver	Puceron	PUC_EPI_PLANT	Pucerons des épis_%

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Blé dur d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANT	Acridons d'automne (sur plantes)_%
Blé dur d'hiver	Rouille brune du blé	RBF3	Rouille Brune F3
Blé dur d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_R3	Rouille Jaune F3
Blé dur d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF3	Septoriose F3
Blé tendre d'hiver	Fusariose	FUSA_TIG_%	Fusariose base tige_%
Blé tendre d'hiver	Helminthosporiose	HELMIN_F3	Helminthosporiose F3
Blé tendre d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF3	Oidium F3
Blé tendre d'hiver	Piétin verse	PV_%	Piétin verse_%
Blé tendre d'hiver	Puceron	PUC_EPI_PLANT	Acridons des épis_%
Blé tendre d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANT	Acridons d'automne (sur plantes)_%
Blé tendre d'hiver	Rouille brune du blé	RBF3	Rouille Brune F3
Blé tendre d'hiver	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_R3	Rouille Jaune F3
Blé tendre d'hiver	Septoriose des céréales tritici	SEPF3	Septoriose F3
Colza d'hiver	Altise	A%M	Altises : % de plantes avec morsures
Colza d'hiver	Altise Grosse d'hiver du Colza	GANbPE	Piège enterré : Nb d'altises d'hiver (grosses altises)
Colza d'hiver	Altise petite des crucifères	PANbV	Piège : Nb d'altises des crucifères (Petites altises)
Colza d'hiver	Charançon de la tige du chou	ChCNbV	Piège : Nb de charançons tige du chou
Colza d'hiver	Charançon de la tige du colza	ChTNbV	Piège : Nb de charançons tige du colza
Colza d'hiver	Charançon du bourgeon terminal	CBTNbV	Piège : Nb de charançons du bourgeon terminal
Colza d'hiver	Méligèthe du colza	Mel%P	Méligèthe : % de plantes (en parcelle) avec présence

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Colza d'hiver	Phoma	Pho%N	Phoma : % de plantes avec nécrose au collet
Colza d'hiver	Puceron vert du pêcher	PV%P	Puceron vert : % de plantes avec présence
Colza d'hiver	Sclérotiniose	ScI%C	Sclérotinia : % de plantes avec symptômes collet
Maïs	Chrysomèle des racines du maïs	CHRYSM_NBCHRYSM_SEXUEL	Chrysomèle piège sexuel par semaine
Maïs	Insectes foreurs de la tige	FOR_%PL_AFTOUR	Forçeurs de tige attequés avt recolte
Maïs	Pyrale du maïs	PYR_PHE_NB	Pyrale Phéromone
Maïs	Sésamie	SES_PHE_NB	Sésamie Phéromone
Maïs	Taupin	TAUPINS	Taupins
Orge d'hiver	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F3	Helminthosporiose teres F3
Orge d'hiver	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3
Orge d'hiver	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANT	Puceron %d automne (sur plantes)_%
Orge d'hiver	Rhynchosporiose	RHYNCF3	Rhynchosporiose F3
Orge d'hiver	Rouille jaune de l'orge D teres	ROUIL_JAU_F3	Rouille Jaune F3
Orge de printemps	Helminthosporiose de l'orge D teres	HELMIN_F3	Helminthosporiose teres F3
Orge de printemps	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3
Orge de printemps	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PLANT	Puceron %d automne (sur plantes)_%
Orge de printemps	Rhynchosporiose	RHYNCF3	Rhynchosporiose F3
Pois d'hiver	Anthraxose	ANTHRA_INF	Anthraxose moitié inf. végétation (%)
Pois d'hiver	Botrytis du pois	BOTRYT_%	Botrytis (%)
Pois d'hiver	Mildiou du pois	MILD_SUP_%	Mildiou 2nd conta. : moitié sup. végé. (%)
Pois d'hiver	Oïdium du pois	OID_INF_%	Oïdium : moitié inf. de la végétation (%)
Pois d'hiver	Puceron vert du pois	PUCVERT_NB	Puceron vert du pois

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Pois d'hiver	Rouille du pois	ROUIL_INF_%	Rouille : moitié inf. de la végétation (%)
Pois d'hiver	Sitone du pois	SITONE	Sitone du pois
Pois d'hiver	Tordeuse du pois	TORDPOIS	Tordeuse du pois
Pois de printemps	Anthracnose	ANTHRA_INF_%	Anthracnose moitié inf. végétation (%)
Pois de printemps	Botrytis du pois	BOTRYT_%	Botrytis (%)
Pois de printemps	Mildiou du pois	MILD_INF_%	Mildiou 2nd conta. : moitié inf. végé. (%)
Pois de printemps	Oïdium du pois	OID_INF_%	Oïdium : moitié inf. de la végétation (%)
Pois de printemps	Puceron vert du pois	PUCVERT_NB	Puceron vert du pois
Pois de printemps	Rouille du pois	ROUIL_INF_%	Rouille : moitié inf. de la végétation (%)
Pois de printemps	Sitone du pois	SITONE	Sitone du pois
Pois de printemps	Tordeuse du pois	TORDPOIS	Tordeuse du pois
Pomme de terre	Alternariose de la pomme de terre	ALTERNA	Alternariose
Pomme de terre	Doryphores	DORYPHORES_ADULTES	Doryphores adultes sur 20 stations
Pomme de terre	Mildiou de la pomme de terre	MILDIOU	Mildiou
Pomme de terre	Puceron	NB_PUCERON_FOL	Puceron nb sur folioles
Tournesol	Limace	ManLim	Limaces - dégâts sur plantes (en parcelle)
Tournesol	Phoma macdonaldi	PhaFeu	Phoma - % de plantes avec symptômes Feuilles
Tournesol	Maladie des tâches noires		
Tournesol	Phomopsis du tournesol	PhoFeu	Phomopsis - % de plantes avec symptômes Feuilles
Tournesol	Puceron noir de la fève	PucNoi	Puceron noir de la fève - % de plantes avec présence
Tournesol	Puceron vert du prunier	PucV%PI	Puceron vert du prunier - % de plantes avec pucerons
Triticale	Fusariose	FUSA_TIG_%	Fusariose base tige_%
Triticale	Oïdium des céréales	OIDF3	Oïdium F3

Culture	Organisme	Code métrique	Protocole Vigicultures
Triticale	Piétin verse	PV_%	Piétin verse_%
Triticale	Puceron vecteurs de viroses	PUC_AUT_PEAUTON%	Puceron d automne (sur plantes)_%
Triticale	Rouille brune du blé	RBF3	Rouille Brune F3
Triticale	Rouille jaune des céréales	ROUIL_JAU_R3	Rouille Jaune F3
Triticale	Septoriose des céréales tritici	SEPF3	Septoriose F3